

➤ **Principali variazioni riguardanti i criteri di sospensione temporanee e permanenti**

Nel seguito le differenze più significative dei criteri di selezione fra il DM 2/11/2015 ed il precedente del 03/03/2005.

Gravidanza	la sospensione dopo il parto (o dopo l'interruzione della gravidanza) è di 6 mesi
Herpes simplex tipo I	non è più prevista sospensione
Malattie autoimmuni	è prevista l'esclusione delle forme multi-organo. La sospensione per tireopatia autoimmune non è definitiva ma limitata alle fasi ipertiroidee con trattamento antitiroideo in corso, mentre può donare chi ha una forma spenta senza trattamento o con solo trattamento sostitutivo.
Cure odontoiatriche	l'implantologia, assimilata ad intervento chirurgico minore, prevede 1 settimana di sospensione dalla completa guarigione. Nel caso di innesto osseo è prevista una sospensione di 4 mesi
Diabete	esclusione permanente dei soggetti in trattamento insulinico. Idoneità se diabete compensato che non richiede trattamento insulinico.
Conviventi e partner sessuali di soggetti positivi per HbsAg (epatite B)	è prevista la sospensione di 4 mesi dall'ultima esposizione anche se il donatore è vaccinato per l'epatite B
	Nel dettaglio ulteriori indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>storia di epatite B o C o positività nota per HBsAg o HBcAb (anti-core) o anti-HCV: esclusione permanente;</i> ✓ <i>storia di epatite non specificata: esclusione temporanea con richiesta di documentazione ed eventuale richiesta di markers epatitici (HBsAg, HBsAb, HBcAb, anti-HCV);</i> ✓ <i>convivente e partner sessuale di persona positiva per HbsAg e/o anti-HCV (anche se negativizzata per HCV-RNA): sospensione fino a 4 mesi dalla fine della convivenza o dall'ultimo rapporto (anche se il donatore è vaccinato per HBV).</i>
Malaria	la sospensione per coloro che hanno visitato un'area ad endemia malarica è di 12 mesi. La sospensione di 12 mesi può essere ridotta a 6 se il donatore è in possesso di un test anti-malarico negativo.
Malattia di Chagas (Tripanosomiasi Americana)	chi è nato, o la cui madre è nata, oppure chi ha viaggiato e soggiornato in zone a rischio (camping, trekking) nei paesi dove la malattia è endemica (America del sud, America centrale e Messico) può donare solo a fronte di un test negativo per anticorpi anti-Tripanosoma Cruzii.

Ad oggi il Decreto Ministeriale, non fornisce chiare indicazioni sul tipo di **test anti-malarico** e **anti-Tripanosoma Cruzii** da eseguire. Il Servizio Trasfusionale di Riferimento si sta organizzando per affrontare e risolvere tale criticità.

Non appena avremo più chiare indicazioni sul tipo di test, dove sia possibile effettuarlo e chi dovrà sostenerne i costi, sarà nostra cura informarvi.

La Direzione Tecnica
UdR Fidas ADSP Onlus